

InGel® Active

Denní dávka obsahuje:	1 porce	%*
Planox® L	120 mg	-
Kyselina hyaluronová	45 mg	-
Active komplex	1×10 ⁹	-
Vláknina	2,9 g	-
Vitamin C	12 mg	15


* referenční hodnota příjmu / - není stanoveno

Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí a chrupavek.

Složení: inulín (vláknina), maltodextrin, želírující látka: xanthan, konjakový glukomannan; přírodní aroma, Planox® L – extrakt z listů verbeny citronové (Lippia citriodora), kyselina hyaluronová (sodná sůl kyseliny hyaluronové), regulátor kyselosti: kyselina citronová; kyselina L-askorbová, Active komplex bifidobakterií a laktobacilů (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum, Streptococcus thermophilus), sladidlo: sukralóza, steviol-glykosidy. Bez lepku. Vhodné pro osoby s nesnášenlivostí lepku, vegetariány, diabetiky.

Minimální trvanlivost do:

InGel® Active




InGel® Active

Gelový doplněk stravy se sladidly v prášku

▶ s kyselinou hyaluronovou, bylinným extraktem Planox® L, komplexem bifidobakterií a laktobacilů

30 sáčků (porcí)
189 g



Doporučené dávkování: 1 sáček (porce) denně nejlépe jako poslední večerní nápoj. Nepřekračujte doporučenou denní dávku.

Návod k použití: Obsah sáčku vsypte do sklenice, přilijte 100 ml vody o teplotě do 35 °C a ihned dobře rozmíchejte. Pokud ponecháte vzniklý nápoj asi 5 minut odstát, dosáhnete hustší konzistence vhodné i ke konzumaci lžičkou.

Upozornění: Produkt nesmí být konzumován v suchém stavu, ale pouze po rozpuštění v tekutině podle návodu k použití. Doplněk stravy není náhradou pestré stravy. Výrobek není určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí.

Skladujte při teplotě do 25 °C a rel. vlhkosti do 60 %.

Výrobce: GOLDIM spol. s r.o., Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4, Česká republika

